


دایمولاکس DAYMOLAX



دایمولاکس

۲۰ قرص ۵۰۰ میلی گرم

فاقد گیاه سنا!
درمان یبوست
پاکسازی دستگاه گوارش



Ingredients:
Crocus sativus, Ficus tarsonata,
Terminalis chebula, Albizia
Dosage:
Take 1 tablet every night before sleeping
Contraindications:
- Keep out of reach of children
- Contraindicated in pregnancy
- For further information please
see enclosed leaflet
Daymond pharmaceutical Co.
Manufactured by Sephan Farooqi Co.
Tehran - IRAN

Batch No:
Mfg Date:
Exp. Date: 2 years from production



درمان یبوست
پاکسازی دستگاه گوارش

حب الذهب



۲۰ قرص
۵۰۰ میلی گرم

فوائد درمانی در طب سنتی

این فرآورده به عنوان یک مسهل اخلاط فاسد را از بدن به وسیله اسهال دفع کرده و بدن و معده و سر را پاک می کند. همچنین در سردرد و شقیقه سودمند بوده و چشم را جلا می دهد.

فوائد درمان


- درمان یبوست
- پاکسازی دستگاه گوارش
- دفع اخلاط فاسد از بدن، معده و سر
- کاهش سر دردهای ناحیه شقیقه

اجزاء فرآورده

این فرآورده شامل صبر زرد، زعفران، پوست هلیله زرد، برگ گل سرخ است.

صبر زرد

با نام علمی Aloe Vera دارای برگ های سبز و گوشتی است و درون برگ ها ترکیبات ژل مانند شفاف و خوراکی وجود دارد. عصاره این گیاه فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی را داراست. اثرات درمانی که برای این گیاه ادعا شده شامل سندرم خستگی مزمن، سوء هاضمه و بیماری های معده ای، دیابت و... است.



زعفران

با نام علمی *Crocus Sativus* گیاهی علفی، بدون ساقه و پایاست. مهم ترین ترکیبات زعفران کروسین، پیکروکروسین و سافرانال هستند. همچنین فلاونوئیدهای موجود در زعفران، خاصیت ازبین بردن رادیکال های آزاد به خصوص رادیکال های آزاد سوپراکسید را دارند. زعفران به علت دارا بودن مواد تلخ موجب سهولت هضم غذا می شود و نیز می توان از آن به عنوان یک ماده اشتها آور، نشاط آور، محرک معده استفاده کرد.

پوست هلیله زرد

با نام علمی *Terminalia chebula* دارای ترکیبات تانی و فنلی مثل اسید گالیک، اسید الاجیک و گالوتانن و ترکیبات فلاونوئیدی و تری ترپنی است. برای درمان بیماری هایی همچون صرع، اسهال، سدر (سیاهی رفتن چشم) و برخی مشکلات چشمی و برخی از انواع سردرد به کار رفته است و دارای، ضدباکتری، ضدقارچی و ضد ویروسی است.

برگ گل سرخ

با نام علمی *Rosa damascene* دارای ترکیباتی مانند آلکالوئیدها، فلاونوئیدها و ترکیبات آلی و اسانس می باشد. از گذشته دور در پزشکی سنتی به عنوان یک داروی گیاهی برای بیماری و برون روی (اسهال)، دردهای روماتیسمی، تقویت کلیه و بیوست کاربرد دارد.

آثار فارماکولوژی و مکانیسم اثر

صبر زرد به عنوان ماده موثره اصلی فرآورده ی دارای مقادیر زیادی از گلیکوزیدهای آنترون c- ۱۰ - گلیکوزیل مانند آلوئین A، آلوئین B و ... می باشد. این مشتقات دارای اثر لاکساتیو هستند و در روده توسط آنزیم گلیکوزیداز فلور آن به فرم آنترون فعال متابولیزه شده و ثموجب اسهال می شوند. این فرآورده به دلیل داشتن مقادیر عمده از صبر زرد ابتدا با تاثیر بر حرکت کولون و مهار سکون روده و تحریک انقباضات بیرون رونده آن موجب عبور سریع مواد از روده شده و به علت کاهش زمان عبور، جذب مایعات از روده را کم می نماید. به علاوه تحریک ترشح کلرید فعال باعث افزایش محتوای آب و الکترولیت می شود. بنابراین به طور کلی دو مکانیسم برای اثر این دارو مطرح است اول تحریک روده بزرگ توسط مهار پمپ سدیم/پتاسیم و کانال کلر در غشاء کولون و در نتیجه افزایش عبور کولون و دوم تاثیر بر فرآیندهای ترشح (تحریک موکوس و ترشح کلراید) و در نتیجه افزایش ترشح مایعات است. مطالعات نشان می دهد که اثرات صبر زرد در افزایش حرکت کولون به واسطه تحریک مستقیم نورونهای کولون و احتمالاً پروستاگلاندین ها انجام می شود. فرآیند دفع معمولاً پس از ۶ تا ۱۲ ساعت از مصرف دارو رخ می دهد که این تاخیر زمان رسیدن دارو به کولون و متابولیزه شدن آن به فرم ترکیب فعال است.



تداخل دارویی

مصرف همزمان فرآورده های حاوی صبر زرد با دیورتیک های تیازید، کورتیکواستروئیدها و شیرین بیان باید با احتیاط باشد. مصرف طولانی مدت همزمان یا به تنهایی هرکدام از این داروها ممکن است منجر به هیپوکالامی شود. به دلیل تاثیر مسهل دارو و کاهش زمان ماندن مواد در روده موجب کاهش جذب داروهای خوراکی می گردد.

میزان مصرف

هر شب یک عدد قرص قبل از خواب (یک ساعت پس از صرف شام) میل شود.

موارد عدم مصرف

- ◀ مصرف این دارو در خانم های باردار و شیرده توصیه نمی شود.
- ◀ همچنین در بیماری های کبدی، نارسایی کلیه ها و دهیدراتاسیون شدید (با از دست دادن آب و الکترولیت) منع مصرف دارد.
- ◀ به دلیل اینکه بخش عمده فرآورده را صبر زرد تشکیل می دهد این فرآورده در موارد انسداد روده ای، بیماری التهاب روده ها (مانند بیماری کرون، کولیت اولسراتیو، سندرم روده تحریک پذیر) هر نوع ایلتوس شکم حاد جراحی، انسداد روده، تجمع مدفوع در روده ها (Fecal Impaction) آپاندیسیت و درد شکم با منشاء ناشناخته منع مصرف دارد.

عوارض جانبی

مصرف طولانی مدت این فرآورده می تواند منجر به از دست دادن الکترولیت ها بویژه پتاسیم و به هم خوردن تعادل الکترولیت بدن گردد. بیمارانی که بیش از یک تا دو هفته صبر زرد مصرف می نمایند ممکن است هیپوکالامی را تجربه نمایند. توصیه می شود بیش از هشت روز مورد استفاده قرار نگیرد. (جز با صلاح دید پزشک)

DAYMOLAX

- ۱- عقیلی خراسانی شیرازی، سید محمد حسین، قرابادین کبیر، انتشارات موسسه مطالعات تاریخ و پزشکی طبی اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، نشر یکم، ۱۳۸۶، صفحه ۱۰۵۸.
- 2- Gardner Z. and McGuffin M., **Botanical Safety Handbook**, Boca Raton, CRC Press, 2013
- 3- **PDR for Herbal Medicine**, Montvale, Thomson, 4th ed., 2007.
- 4- **The Complete German Commission E Monographs**, American Botanical Council, Austin, 1998, p.80.
- 5- **PDR for Herbal Medicine**, Montvale, Thomson, 4th ed., 2007, p.19.
- 6- Barnes J., Anderson L.A., Philipson J.D., **Herbal Medicine**, Pharmaceutical Press, London, 1996, p.44.
- 7- **ESCOP Monographs**, Thieme, New York, 2003, p.26.



New Product from Daymond Pharmaceutical Co

www.Daymond.ir



@Daymond.Pharma



تهران - سهروردی - شرکت داروسازی دیموند



۰۲۱-۲۲۵۱۵۲۰۰ | ۰۲۱-۲۲۵۱۱۲۰۰

